## 済生会熊本病院レジメン一覧(腎細胞がん)

レジメン名	薬剤名(一般名)	略号	投与量	施行日	1クール (日数)	催吐性リスク
(2週毎)Nivolumab 240mg	オプジーボ(ニボルマブ)		240mg/body	day1	14日	最小度
(4週毎)Nivolumab 480mg	オプジーボ(ニボルマブ)		480mg/body	day1	28日	最小度
Nivolumab+Ipilimumab	オプジーボ(ニボルマブ)		240mg/body	day1	21日	最小度
	ヤーボイ(イピリムマブ)		1mg/kg	day1		
Axitinib+Pembrolizumab	インライタ (アキシチニブ)		10mg/日	連日服用	21日	最小度
	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)		200mg/body	day1		
Axitinib+Avelumab	インライタ (アキシチニブ)		10mg/日	連日服用	14日	最小度
	バベンチオ(アベルマブ)		10mg/kg	day1		
(2週毎)Cabo+Nivo 240mg	カボメティクス(カボザンチニブ)		40mg/日	連日服用	14日	最小度
	オプジーボ(ニボルマブ)		240mg/body	day1		
(4週毎)Cabo+Nivo 480mg	カボメティクス (カボザンチニブ)		40mg/日	連日服用	-28日	最小度
	オプジーボ(ニボルマブ)		480mg/body	day1		
(3週毎)Lenvatinib+Pembrolizumab 200mg	レンビマ(レンバチニブ)		20mg/日	連日服用	-21日	中等度
	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)		200mg/body	day1		
(6週毎)Lenvatinib+Pembrolizumab 400mg	レンビマ(レンバチニブ)		20mg/日	連日服用	-42日	中等度
	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)		400mg/body	day1		

2023/7/1更新