

不眠時指示

65歳以上、DMなし、ベルソムラ・デジレル・クエチアピン

- ①ベルソムラ(15)1T (1回まで) →定期内服していればスキップ
- ②デジレル(25)1T (1回まで)
- ③クエチアピン(25)1T (2回まで可。1時間空けて)
- ④ヒルナミン(5)1T (3回まで可。1時間空けて)
- ⑤セレネース 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴
(①~④で効果ない時、内服出来ない時。1時間空けて3回/日まで可。)
- ⑥ヒルナミン 0.5A im
(①~⑤でも効果ない時。1時間空けて3回/日まで可。)

65歳以上、DMあり、ベルソムラ・デジレル

- ①ベルソムラ(15)1T (1回まで) →定期内服していればスキップ
- ②デジレル(25)1T (1回まで)
- ③ヒルナミン(5)1T (3回まで可。1時間空けて)
- ④セレネース 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴
(①~③で効果ない時、内服出来ない時。1時間空けて3回/日まで可。)
- ⑤ヒルナミン 0.5A im
(①~④でも効果ない時。1時間空けて3回/日まで可。)

65歳未満、DMなし、ベルソムラ・デジレル・クエチアピン

- ①ベルソムラ(20)1T (1回まで) →定期内服していればスキップ
- ②デジレル(25)1T (1回まで)
- ③クエチアピン(25)1T (2回まで可。1時間空けて)
- ④ヒルナミン(5)1T (3回まで可。1時間空けて)
- ⑤セレネース 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴
(①~④で効果ない時、内服出来ない時。1時間空けて3回/日まで可。)
- ⑥ヒルナミン 0.5A im
(①~⑤でも効果ない時。1時間空けて3回/日まで可。)

65歳未満、DMあり、ベルソムラ・デジレル

- ①ベルソムラ(20)1T (1回まで) →定期内服していればスキップ
- ②デジレル(25)1T (1回まで)
- ③ヒルナミン(5)1T (3回まで可。1時間空けて)
- ④セレネース 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴
(①~③で効果ない時、内服出来ない時。1時間空けて3回/日まで可。)
- ⑤ヒルナミン 0.5A im
(①~④でも効果ない時。1時間空けて3回/日まで可。)

65歳以上、DMなし、パーキンソニズムあり、

- ①ベルソムラ(15)1T (1回まで) →定期内服していればスキップ
- ②デジレル(25)1T (1回まで)
- ③クエチアピン(25)1T (2回まで可。1時間空けて)
- ④ヒルナミン(5)1T (3回まで可。1時間空けて)
- ⑤コントミン 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴 or コントミン 0.5A im
(①~④で効果ない時や、内服出来ない時。1時間おいて3回/日まで可。血圧低下に注意。)

65歳以上、DMあり、パーキンソニズムあり、

- ①ベルソムラ(15)1T (1回まで) →定期内服していればスキップ
- ②デジレル(25)1T (1回まで)
- ③ヒルナミン(5)1T (3回まで可。1時間空けて)
- ④コントミン 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴 or コントミン 0.5A im
(①~③で効果ない時や、内服出来ない時。1時間おいて3回/日まで可。血圧低下に注意。)

65歳未満、DMなし、パーキンソニズムあり、

- ①ベルソムラ(20)1T (1回まで) →定期内服していればスキップ
- ②デジレル(25)1T (1回まで)
- ③クエチアピン(25)1T (2回まで可。1時間空けて)
- ④ヒルナミン(5)1T (3回まで可。1時間空けて)
- ⑤コントミン 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴 or コントミン 0.5A im
(①~④で効果ない時や、内服出来ない時。1時間おいて3回/日まで可。血圧低下に注意。)

65歳未満、DMあり、パーキンソニズムあり、

- ①ベルソムラ(20)1T (1回まで) →定期内服していればスキップ
- ②デジレル(25)1T (1回まで)
- ③ヒルナミン(5)1T (3回まで可。1時間空けて)

④コントミン 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴 or コントミン 0.5A im

(①～③で効果ない時や、内服出来ない時。1時間おいて3回/日まで可。血圧低下に注意。)