

## せん妄時指示

### DM なし、腎障害なし、脳血管障害なし：①

興奮普通、幻覚妄想がさほど強くない場合

- ①リスペリドン(0.5)1T (1時間おいて6回/日まで可)
- ②セレネース 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴  
(①で効果ない時や、内服出来ない時。1時間おいて3回/日まで可。)
- ③ヒルナミン 0.5A im  
(②でも効果ない場合。1時間おいて3回/日まで可。)

### DM なし、腎障害なし、脳血管障害なし：②

興奮強く、幻覚や妄想が活発な場合

- ①ジプレキサ(2.5)1T (1時間おいて3回/日まで可)
- ②セレネース 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴  
(①で効果ない時や、内服出来ない時。1時間おいて3回/日まで可。)
- ③ヒルナミン 0.5A im  
(②でも効果ない場合。1時間おいて3回/日まで可。)

### DM なし、腎障害なし、脳血管障害なし：③

日中の眠気が強い場合 or 誤嚥リスクが高い場合

- ①クエチアピン(25)1T (1時間おいて6回/日まで可)
- ②セレネース 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴  
(①で効果ない時や、内服出来ない時。1時間おいて3回/日まで可。)
- ③ヒルナミン 0.5A im  
(②でも効果ない場合。1時間おいて3回/日まで可。)

### DM なし、腎障害なし、脳血管障害なし：④

低活動性せん妄の場合

- ①エビリファイ(3)0.5T (1時間おいて6回/日まで可)
- ②セレネース 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴  
(①で効果ない時や、内服出来ない時。1時間おいて3回/日まで可。)

③ヒルナミン 0.5A im

(②でも効果ない場合。1時間おいて3回/日まで可。)

#### DMなし、腎障害なし、脳血管障害あり

グラマリールを夕に定期薬とする。25mgより開始し100mgまで適宜増減。  
頓服はリスペリドン。

①リスペリドン(0.5)1T (1時間おいて6回/日まで可)

②セレネース 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴

(①で効果ない時や、内服出来ない時。1時間おいて3回/日まで可。)

③ヒルナミン 0.5A im

(②でも効果ない場合。1時間おいて3回/日まで可。)

#### DMなし、腎障害あり、幻覚妄想がさほど強くない場合

①ルーラン(4)1T (1時間おいて6回/日まで可)

②セレネース 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴

(①で効果ない時や、内服出来ない時。1時間おいて3回/日まで可。)

③ヒルナミン 0.5A im

(②でも効果ない場合。1時間おいて3回/日まで可。)

#### DMなし、腎障害あり、幻覚妄想が強い場合

①ジプレキサ(2.5)1T (1時間おいて3回/日まで可)

②セレネース 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴

(①で効果ない時や、内服出来ない時。1時間おいて3回/日まで可。)

③ヒルナミン 0.5A im

(②でも効果ない場合。1時間おいて3回/日まで可。)

#### DMなし、腎障害あり、日中の眠気が強い場合

①クエチアピン(25)1T (1時間おいて6回/日まで可)

②セレネース 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴

(①で効果ない時や、内服出来ない時。1時間おいて3回/日まで可。)

③ヒルナミン 0.5A im

(②でも効果ない場合。1時間おいて3回/日まで可。)

### DM なし、腎障害あり、低活動せん妄の場合

- ①エビリファイ(3)0.5T (1時間おいて6回/日まで可)
- ②セレネース 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴  
(①で効果ない時や、内服出来ない時。1時間おいて3回/日まで可。)
- ③ヒルナミン 0.5A im  
(②でも効果ない場合。1時間おいて3回/日まで可。)

### DM あり、腎障害なし、脳血管障害なしの場合

- ①リスペリドン(0.5)1T (1時間おいて6回/日まで可)
- ②セレネース 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴  
(①で効果ない時や、内服出来ない時。1時間おいて3回/日まで可。)
- ③ヒルナミン 0.5A im  
(②でも効果ない場合。1時間おいて3回/日まで可。)

### DM あり、腎障害なし、脳血管障害ありの場合

グラマリールを夕に定期薬とする。25mgより開始し100mgまで適宜増減。  
頓服はリスペリドン。

- ①リスペリドン(0.5)1T (1時間おいて6回/日まで可)
- ②セレネース 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴  
(①で効果ない時や、内服出来ない時。1時間おいて3回/日まで可。)
- ③ヒルナミン 0.5A im  
(②でも効果ない場合。1時間おいて3回/日まで可。)

### DM あり、腎障害なし、日中の眠気が強い場合

- ①エビリファイ(3)0.5T (1時間おいて6回/日まで可)
- ②セレネース 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴  
(①で効果ない時や、内服出来ない時。1時間おいて3回/日まで可。)
- ③ヒルナミン 0.5A im  
(②でも効果ない場合。1時間おいて3回/日まで可。)

DM あり、腎障害あり、日中に割と起きている場合

- ①ルーラン(4)1T (1時間おいて6回/日まで可)
- ②セレネース 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴  
(①で効果ない時や、内服出来ない時。1時間おいて3回/日まで可。)
- ③ヒルナミン 0.5A im  
(②でも効果ない場合。1時間おいて3回/日まで可。)

DM あり、腎障害あり、日中の眠気が強い場合

- ①エビリファイ(3)0.5T (1時間おいて6回/日まで可)
- ②セレネース 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴  
(①で効果ない時や、内服出来ない時。1時間おいて3回/日まで可。)
- ③ヒルナミン 0.5A im  
(②でも効果ない場合。1時間おいて3回/日まで可。)

パーキンソニズムあり、DM なしの場合

- ①クエチアピン(25)1T (1時間おいて6回/日まで可)
- ②コントミン 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴 or コントミン 0.5A im  
(①で効果ない時や、内服出来ない時。1時間おいて3回/日まで可。血圧低下に注意。)

パーキンソニズムあり、DM ありの場合

- ①エビリファイ(3)0.5T (1時間おいて6回/日まで可)
- ②コントミン 0.5A+生食 50ml。30分かけて点滴 or コントミン 0.5A im  
(①で効果ない時や、内服出来ない時。1時間おいて3回/日まで可。血圧低下に注意。)